

# いわて平泉米だより

令和3年9月号

## 令和3年産水稻の刈り取りが始まります

○登熟積算気温によるコンバイン収穫の場合の  
刈り取り開始時期の目安（8/27現在）

品種 ひとめぼれ  
積算温度 1000℃

アメダス地点	標高 (m)	出穂期	刈り取り開始時期 (月/日)		
			平均気温 2℃低い	平均気温 平年並	平均気温 2℃高い
一関市竹山町	32	7/28	9/9	9/8	9/7
		7/30	9/12	9/10	9/9
		8/1	9/15	9/13	9/11
千厩町	120	7/28	9/12	9/10	9/9
		7/30	9/15	9/13	9/11
		8/1	9/17	9/15	9/13

### 刈り取り適期の判断 ～収穫作業の留意点～

刈り取り予定日に近づいたら、次の手順で判断しましょう。

#### ○黄化もみ割合のチェック

平均的な大きさの穂を観察し、黄化したもみが1穂もみ数に占める割合を確認します。

刈り取り適期は「黄化もみ割合 80～90%」（80～90%のもみが黄化、10%程度が緑色の状態）です。

#### ○テストもみすりによるチェック

黄化もみ割合が80～90%に達したら、数穂を試しにもみすりしてみましょう。

積算気温による刈り取り適期の判断は、栽培法や日照時間によって前後する場合がありますので、実際の登熟状態を確認してください。